

"على المترشح ان يختار أحد الموضوعين الآتيين"

الموضوع الأول:

التمرين الأول: (05 نقاط)

للإنزيمات بنية فراغية مميزة تمكنها من أداء دور معين، إلا أن نشاط الإنزيمات يمكن أن يتوقف بتدخل عوامل مختلفة، داخلية وخارجية.

بعض السلالات من البكتيريا تصبح مقاومة للمضادات الحيوية مثل مجموعة β لكتامينات


Lactamines - β نتيجة حدوث طفرات، حيث تنتج إنزيم β لكتاماز أصبح قادرا على تحليل المضادات الحيوية β لكتامينات التي تمنع تركيب جدران البكتيريا الحساسة له.

من بين الطرق المستعملة لمكافحة هذه المقاومة المكتسبة، يمكن استخدام مزيج من الجزيئات، مثل مزيج من

اموكسيسيلين (ينتمي الى مجموعة β لكتامينات) مع حمض الكلافولانيك (Acide clavulanique) الذي يثبط إنزيم

β لكتاماز حيث تثبت حمض الكلافولانيك مع إنزيم β لكتاماز غير عكسي الشكل (أ) من الوثيقة المساعدة، الشكل (ب)

من نفس الوثيقة يمثل تطور عدد البكتيريا في حالات مختلفة.



الوثيقة المساعدة

1_ عرّف الإنزيم .

2_ وضح في نص علمي تأثير مختلف العوامل على نشاط الإنزيم مبرزاً تأثير ذلك على البكتيريا و الإنسان .

(النص العلمي مهيكّل بمقدمة و عرض و خاتمة)

التمرين الثاني: (07 نقاط)


تسمح التحولات الطاقوية التي تحدث داخل الخلايا اليخضورية بنمو بعض الأعشاب الضارة إلى جانب المحاصيل الزراعية، لذلك تُستعمل مبيدات عشبية إنتقائية مُثبِّطة لهذه التحولات الطاقوية قصد القضاء على هذه الأعشاب دون التأثير على المحاصيل الزراعية، لفهم آلية ذلك نُقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

السيمازين (Simazine) مبيد عشبي يُخلط بماء الري، بهدف التخلص من الأعشاب الضارة التي تُنافس المحاصيل الزراعية كالذري على المغذيات في التربة وتؤثر على إنتاجيتها، من أجل التعرف على آلية تأثير هذا المبيد، نُقترح عليك معطيات الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) من الوثيقة (1) يمثل نتائج قياس نسبة غاز الأوكسجين المنطلق من عشب ضار بدلالة تركيز المبيد السيمازين، في وسط مغلق يسمح بدخول الضوء وفي وجود CO_2 .

- الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل نتائج متابعة كمية $C^{14}O_2$ المشع المثبتة في أوساط بها معلق من الصانعات الخضراء للعشب الضار، مُضاف إليها $C^{14}O_2$ مشع وعناصر مختلفة.




- يتبين تأثير المبيد العشبي السيمازين على الأعشاب الضارة وذلك باستغلال الوثيقة (1).


الجزء الثاني:

لاظهار آلية التأثير الإنتقائي للمبيد العشبي السيمازين بدقة على التحولات الطاقوية عند الأعشاب الضارة دون التأثير على محاصيل الذري، نُقترح عليك الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ) يوضح رسم تخطيطي لإنتقال الإلكترونات داخل النظام الضوئي الثاني في غياب السيمازين وفي وجوده.

- الشكل (ب) يوضح رسم تخطيطي لمسار السيمازين في كل من العشب الضار ونبات الذري.





- وضح بدقة آلية التأثير الإنتقائي للسيمارين على الأعشاب الضارة دون المحاصيل الزراعية وذلك باستغلال الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

التسرطن مشكلة صحية خطيرة ينصح الأطباء الوقاية منها بتفادي مسبباتها و من بينها التدخين ،فالتدخين افة اجتماعية تؤدي الى الإصابة بمرض سرطان الرئة و بالتالي الموت.

الدراسة التالية توضح جانب من تدخل النيكوتين السام المستمد من السجائر و علاقته بالتسرطن و تعطيل بعض الاليات المناعية.

الجزء الأول:

يتدخل الجهاز المناعي عادة لإقصاء المستضدات الغريبة و الخلايا من الذات المصابة من جهة و ضد الخلايا المسنة والسرطانية من جهة أخرى .


التسرطن هو تحول الخلايا المسنة المبرمجة للموت الى خلايا ذاتية التحكم (خالدة) مستقلة بنشاطها ذات تكاثر عشوائي، تسبب اعتلالا للعضوية في مختلف نشاطاتها.

الشكل (أ) من الوثيقة 1 يوضح نشاط LTC في غياب و في وجود تراكيز مختلفة من سم النيكوتين المستخرج من السجائر ضد عدد من الخلايا المسنة.

الشكل (ب) من الوثيقة 1 يوضح نسبة الخلايا المسنة المتحولة في وجود تراكيز مختلفة من سم النيكوتين .

1- بين تأثير على الخلايا المسنة مبرزا المشكل العلمي المطروح باستغلال أشكال الوثيقة -1 - .

2- اقترح فرضية تسمح بحل المشكل المطروح.



الجزء الثاني:

للتحقق من مدى صحة الفرضية المقترحة و حل المشكل العلمي المطروح انجزت الدراسة الموضحة بالوثيقة -2- التالية:



- الشكل (أ) يمثل جزء من السلسلة المستنسخة لبروتين P 53 المسؤول عن تثبيط تشكل الورم السرطاني: (R1) في غياب سم النيكوتين و (R2) في وجود سم النيكوتين أما الشكل (ب) فيوضح جزء من جدول الشفرة الوراثية. الشكل (ج) يوضح صورة بالمجهر الالكتروني لنشاط خلايا لمفاوية ضد خلايا مسنة في غياب سم النيكوتين. الشكل (د) يوضح رسم تخطيطي لآلية استموات خلايا مسنة في غياب سم النيكوتين.

R₁ : TCT TTG CTC AAG GTC ACG GTT
R₂ : TCT TTG CTC AAG ATC ACG GTT
29 30 31 32 33 34 35

الشكل (أ)

AGA	CAA	UGC	AAC	GAG	UAG	UUC	CAG
Arg	Gln	Cys	Asn	Glu	stop	Phe	Gln

الشكل (ب) : جدول الترميزات و ما يقابلها من أحماض أمينية



الوثيقة 2


- وضح طريقة تأثير النيكوتين مصادقا على صحة الفرضية المقترحة باستغلال اشكال الوثيقة 2.

الجزء الثالث: انجز مخطط توضح من خلاله تأثير المواد المسرطنة على عمل الجهاز المناعي.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (05 نقاط)

ترتبط حياة الكائنات الحية بفعالية ما تنتجه من بروتينات حيث توطر النشاطات الحيوية المختلفة المسؤولة عن النمو، لذلك يعتبر استهداف إنتاج هذه البروتينات عند الكائنات الممرضة إحدى الإستراتيجيات المنتهجة لتثبيط تكاثر و نمو هذه الكائنات خاصة عند الإنسان، تمثل الوثيقة المقابلة إحدى المراحل المهمة في عملية تركيب البروتين وكذا تأثير بعض المضادات الحيوية على هذه المرحلة.



- 1- تعرف على الظاهرة الممثلة بالوثيقة ثم حدد مقر حدوثها ومتطلباتها.
- 2- على ضوء المعلومات التي تقدمها الوثيقة اشرح في نص علمي منظم ومهيكل خطوات المرحلة الموضحة في الوثيقة مبرزاً تأثير بعض المضادات الحيوية مثل (Rifamycins – Quinolones Fluoroquinolones) على هذه العملية.


التمرين الثاني: (07 نقاط)

تتميز الإنزيمات بخصائص بنيوية وظيفية محددة كالتأثير النوعي المزدوج للإنزيم، حيث يسمح بتشكيل المعقد (إنزيم-مادة تفاعل) في منطقة خاصة من الإنزيم تدعى الموقع الفعال.
إن دراسة مختلف الخصائص البنيوية الوظيفية المميزة للإنزيم سمح للعلماء بإنتاج أدوية مختلفة بأعراض جانبية محدودة لعلاج عدة أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم الشرياني.

الجزء الأول:


الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE (L'Enzyme de Conversion de L'Angiotention 1) هي جزيئات تعمل على رفع ضغط الدم الشرياني نجده على الأغشية الهيولية لخلايا الرئة و الكلى وأعضاء أخرى تلعب دورا هاما في تنظيم حجم السوائل في الجسم و بالتالي تنظيم ضغط الدم الشرياني.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): عبارة عن رسم تخطيطي يوضح نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE1.
الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل رسم تخطيطي لبنية الإنزيم ACE.
الشكل (ج) جدول يوضح نسبة تشكل معقد (ACE-ركيزة) في الموقعين C و N.



الشكل ج		
نسبة تشكل المعقد ACE - الركيزة (Kcal/mol)		
الموقع الفعال -	الموقع الفعال -	الركيزة
N	C	الأنجيوتنسين 1 angiotensin I
10.5	8.9	
11	10.9	براديكنين bradykinin

الوثيقة (1)




- حلل مخطط الشكل (أ) من الوثيقة (1).
- باستغلالك للشكلين (ب و ج) من الوثيقة (1) حدد الخواص التي يتميز بها إنزيم ACE.

الجزء الثاني:

تم اقتراح عدة عقاقير (أدوية) لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني ولكن تسببت في ظهور أعراض جانبية مزعجة كالسعال الجاف الناتج عن تراكم البراديكينين Paradykinin في الشعب الهوائية للرئتين.

استغل الخبراء خصائص انزيم ACE لإنتاج دواء ناجع لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الشرياني دون أعراض جانبية كثيرة، لتحديد الدواء الأكثر فعالية في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني نقدم الدراسة التالية:

- يوضح الجدول (أ) من الوثيقة (2) نسبة تشكل المعقد إنزيم-دواء مثبط (E-I) في الموقع الفعال C و N ودرجة تأثرها بهذه الأدوية.
- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نسبة تغير النشاط الإنزيمي بدلالة الزمن في الموقعين C و N عند إضافة هذه الأدوية المثبطة.



- 2- باستغلال أشكال الوثيقة (2) اشرح آلية تأثير الأدوية في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني ثم بين أعراضها الجانبية وبأيها تنصح.

التمرين الثالث: (08 نقاط)


تنتقل الرسالة العصبية من خلية قبل مشبكية إلى خلية بعد مشبكية نتيجة تنبيه فعال في الخلية قبل مشبكية يتدخل في هذا النقل خلايا وشوارد ينتج عنه توليد رسالة عصبية في الخلية بعد مشبكية كما هو الحال في المشبك العصبي العضلي غير أنه قد يحدث خلل في هذا الانتقال ينتج عنه اضطراب في توليد الرسالة العصبية في الخلية قبل مشبكية أو البعد مشبكية وذلك بتدخل عوامل خارجية مثل الساكسوتوكسين (Saxotoxine) الذي يرمز له ب STX.

الجزء الأول:

الساكسوتوكسين من أخطر أنواع السموم والذي تنتجه أنواع من الطحالب المسماة بـ *Dinoflagellates* التي تتكاثر بسرعة هائلة، حوالي مليون طحلب في الملتر الواحد من الماء وهي تسبب سمية كبيرة للحيوانات البحرية كالمحار والسلطعونات ولا تزال بالغسيل، وهو لا يؤثر على الحيوان البحري بل على مستهلك المحار.

- يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) نتائج تجريبية أنجزت على تركيب تجريبي للليف عضلي متصل بعصبون حركي.

- يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة كمية الأسنيل كوايين المحررة في الشق المشبكي إثر تنبيه فعال في المنطقة "س" في غياب سم STX ووجوده.



1- اقترح 3 فرضيات تفسر بها تأثير سم STX على العضلات، باستغلالك معطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:


للمصادقة على صحة الفرضيات المقترحة ننجز الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) التسجيلات الكهربائية أثناء تنبيه كهربائي للليف عصبي لعصبون حركي في غياب STX ووجوده.

- يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة نتائج تجريبية أنجزت على خلية قبل مشيكية حيث تم بتقنية Patch-Clamp فصل قطعتين غشائيتين الأولى تحتوي على قناة فولطية للبوتاسيوم (K^+) والثانية تحتوي على قناة فولطية للكالسيوم (Ca^{++})، حيث حدث تحوصل تلقائي لهذه الأغشية، حققت الحويصلات للقطع الغشائية الأولى بشوارد البوتاسيوم المشع و الثانية حقنت بشوارد الكالسيوم المشع وتم قياس الإشعاع في الوسط الخارجي بعد تنبيه كهربائي للقطع الغشائية في غياب ووجود STX.

- يمثل الشكل (3) قياس التيارات الناتجة عن فرض كمون غشائي على قطعة غشائية تحتوي على قنوات الموضحة في الشكل (4) من الوثيقة (2) في غياب ووجود STX.

- يمثل الشكل (4) نمذجة لقناة فولطية للصوديوم في وجود الساكسوتوكسين.



الوثيقة (2)

- 1- ناقش الفرضيات المقترحة، باستغلالك لاشكال الوثيقة (2).
- 2- اقترح من خلال هذه الدراسة ومكتسباتك خطوات لعلاج التسمم بسم STX.

الجزء الثالث:

من خلال دراستك للموضوع اشرح في رسم تخطيطي عليه كافة البيانات تأثير سم ساكسوتوكسين STX على العضلات.

انتهى الموضوع الثاني.