

الأستاذ : وصيفي ع الرحمان

المدة : ساعتين

الفرض المحروس رقم : 01

ثانوية : بادي مكي (بسكرة)

التمرين الأول: 8 نقاط (إعداد الأستاذ: وصيفي ع الرحمان)

البروتينات هي الجزيئات الأساسية المكونة للمادة الحية و ذلك نظرا للأدوار الأساسية التي تقوم بها في الخلايا الحية، تتواجد البروتينات في كل الخلايا الحية و في كل الأجزاء الخلوية وتؤدي أدوارا مختلفة كإنزيمات، هرمونات بروتينات النقل، التخزين..... إلخ.

والبروتينات هي جزيئات كبيرة تتكون من عدد كبير من الوحدات الأساسية تسمى الأحماض الأمينية **Amino Acides**.

لغرض دراسة سلوك الأحماض الأمينية في الوسط نقدم الجدول أسفله.

PH > PHi	PH = PHi	PH < PHi	الحمض الأميني
	$\begin{array}{c} + \text{-----} - \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} + \text{-----} \\ \end{array}$	حمض أميني متعادل
	$\begin{array}{c} + \text{-----} - \\ \end{array}$		حمض أميني حامضي
$\begin{array}{c} \text{-----} - \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} + \text{-----} - \\ \end{array}$		حمض أميني قاعدي

1- قدم تعريفا للـ PHi ثم أكمل الخانات الفارغة في الجدول.

2- إنطلاقا مما قدك لك ومن معلوماتك بين في نص علمي سلوك الأحماض الأمينية في الوسط معمما ذلك على البروتينات.

التمرين الثاني: 12 نقاط (منقول ومعدل من طرف الأستاذ وصيفي)

من المعروف أن جزيئة ال ARNm هي المسؤولة عن إملء تتابعات الأحماض الأمينية في سلسلة متعدد بيبتيدي من خلال حملها للشفرة الوراثية ، و التي تتكون من أربعة أحرف هي القواعد الأزوتية (A- U- G- C)

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن كيف لشفرة مكونة من أربعة أحرف فقط أن تشفر لـ 20 حمض أميني مختلف؟

الجزء الأول : للإجابة على هذا التساؤل إقترحت الفرضية التالية:

((إن أي حمض أميني يتحدد في السلسلة الببتيدية بـ n نيكلوتيدة من الـ ARNm)) حيث n عدد طبيعي.
1- أ) حدد أصغر قيمة لـ n تسمح بتعيين مختلف الأحماض الأمينية في الببتيد المركب من طرف الخلية.
برر إجابتك.

1- ب) أعد صياغة الفرضية على ضوء ذلك.

للتحقق من صحة هذه الفرضية استعمل كل من Crick و Brenner في سنة 1961 بكتيريا مصابة بفيروس

معالج بعوامل مسببة للطفرات تحدث تغييرا في عدد نيكلوتيدات ADN الفيروسي، نتائج الدراسة ممثلة في جدول الوثيقة (1).

تغيير عدد نيكلوتيدات ADN الفيروسي	متتالية الأحماض الأمينية في البروتين الذي يستعمله الفيروس في إصابة البكتيريا مقارنة بالبروتين في الفيروس الطبيعي (المرجعي)
عدم تغيير في عدد النيكلوتيدات	مماثلة
إضافة أو حذف نيكلوتيدة	عدد مختلف من الأحماض الأمينية
إضافة أو حذف نيكلوتيدتين	عدد مختلف من الأحماض الأمينية
إضافة ثلاث نيكلوتيدات	مماثلة ما عدا حمض أميني إضافي
حذف ثلاث نيكلوتيدات	مماثلة ما عدا حمض أميني ناقص

الوثيقة (1)

(2) أثبت باستدلال منطقي صحة الفرضية المقترحة باستغلال النتائج التجريبية السابقة.
الجزء الثاني:

في نفس السنة 1961 أنجز كل من Matthaei و Nirenberg تجربة على مستخلص بكتيري يحتوي على جميع العناصر الضرورية لتركيب البروتين وخال من الـ ADN ومن الـ ARNm ، أضافا للمستخلص خليطا من مختلف أنواع الأحماض الأمينية و ARNm مصنعا من تتابع نوع واحد من النيكلوتيدات.
بالموازاة استعمل الباحث (Khorana Har Gobin) ARNm مصنع من 3 رامزات أو 4 وباستعمال أكثر من نوع من النيكلوتيدات.

والشكل (أ) للوثيقة (2) يمثل نتائج التجارب المنجزة، والتي مكّنت لاحقا من حل الشفرة الوراثية كما هو مبين في الشكل (ب) للوثيقة (2).

التجارب	ARNm المصنع مضاف إلى المستخلص			متعدد الببتيد المحصل عليه
تجارب Nirenberg و Matthaei	ARNm مصنع من تتابع نوع واحد من النيكلوتيدات		متعدد Poly U	Phé-Phé-Phé...
			متعدد Poly A	Lys-Lys-Lys...
			متعدد Poly C	Pro-Pro-Pro...
تجارب Har Gobin و Khorana	ARNm مصنع من 3 ثم 4 رامزات من تكرار نوعين النيكلوتيدات		متعدد Poly UC	Ser-Leu-Ser
			متعدد Poly AC	Thr-His-Thr-His
	ARNm مصنع من 4 رامزات باستعمال 3 أنواع من النيكلوتيدات من بينها إحدى الرامزات التالية: UAG, UAA أو UGA		ثلاثيات أو ثلاثيات ببتيد	

الشكل (أ) الوثيقة (2)

الأستاذ: وصيفي ع الرحمان ☺☺☺









التصحيح النموذجي:

1:

تعريف نقطة التعادل الكهربائي (PHi)

: هي قيمة pH الوسط يكون عندها الحمض الأميني متعادل كهربائيا، عدد الشحنات الموجبة والسالبة متساوي أي شحنة معدومة ، ولكل حمض أميني pHi خاص به.

إكمال الجدول:

PH > PHi	PH = PHi	PH < PHi	الحمض الأميني
			حمض أميني متعادل
			حمض أميني حامضي
			حمض أميني قاعدي

2- النص العلمي:

* الأحماض الأمينية

هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربوكسيلية (حمضية) (COOH) و مجموعة أمينية (قاعدية) (NH_2) متصلتين بذرة كربون α والتي تتصل بدورها بسلسلة جانبية تعرف بالجذر الألكيلي R يختلف تركيبه من حمض أميني إلى آخر كما تتصل ذرة الكربون ب α بذرة هيدروجين.

* فما هو سلوك الأحماض الأمينية والبروتينات في الوسط في الوسط؟.

* يتغير سلوك الحمض الأميني بتغير درجة pH الوسط، وهجرته في المجال الكهربائي تعتمد على نوع الشحنة التي يكتسبها.

تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات) في الوسط القاعدي وتسلك سلوك القواعد (تكتسب بروتونات) في الوسط الحامضي لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمضية).

القاعدة التي تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني.

$\text{pH} = \text{pHi}$: لايهاجر الحمض الأميني إلى أي قطب (يبقى في المنتصف) ويدل على تساوي الشحنات الموجبة والسالبة ، أي تأين الوظيفة الأمينية (NH_3^+) والحمضية (COO^-) ومنه يسلك سلوك حمض وقاعدة في نفس الوقت.

$\text{pH} > \text{pHi}$: يهاجر الى القطب السالب ويدل على اكتسابه بروتون H^+ من الوسط وتأين الوظيفة الأمينية ومنه يسلك سلوك قاعدة في وسط حامضي.

$\text{pH} < \text{pHi}$: يهاجر الى القطب الموجب ويدل على فقدانه بروتون H من الوسط وتأين الوظيفة الحمضية ومنه يسلك سلوك حمض في وسط قاعدي .

تختلف البروتينات عن بعضها البعض في القدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الأمفوتيرية و خصائصها الكهربائية.

شحنة البروتين هي محصلة شحنات الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه.

* تحتوي كل البروتينات على على مجموعة امينية و مجموعة كربوكسيلية نهائيتان وهي بذلك ثنائية التأين. (تسلك نفس سلوك الحمض الأميني في الوسط)

التمرين الثاني:

الجزء الأول:

1) (أ) أقل عدد ل n هو 3

التبرير : تتابع 3 نيكليوتيدات يعطي 64 إمكانية ما يغطي استعمال الـ 20 حمضا أمينيا.

ب) إعادة صياغة الفرضية:

إن أي حمض أميني يتحدد في السلسلة الببتيدية بتتابع 3 نيكليوتيدات من الـ ARNm

2) إثبات صحة الفرضية: من نتائج التجربة نجد:

- عند إضافة 3 نيكليوتيدات يضاف حمض أميني في البروتين (السلسلة الببتيدية). (1ن)

- عند حذف 3 نيكليوتيدات ينقص عدد الأحماض الأمينية في البروتين بواحد. (1ن)

إن يُحدد الحمض الأميني بتتابع ثلاث نيكليوتيدات في الـ ADN (1ن) (رمزة ARNm)

وهذا يؤكد صحة الفرضية. (0.25)

الجزء الثاني:

(1 أ) تبيان العلاقة:

من تجارب Nirenberg وMatthaei فإن تتابع نوع النيكليوتيدات في الـ ARNm يُشفر لنوع الأحماض الأمينية في البروتين.
(ب) تعيين الرامزات:

- تتابع 3 قواعد من (U) رامزة (UUU) يشفر لحمض الفينيل ألانين (Phe).

- وتتابع 3 قواعد من (A) رامزة (AAA) يشفر لحمض الليسين (Lys).

- بينما تتالي 3 قواعد من (C) رامزة (CCC) يشفر لحمض البرولين (Pro).

(3) تفسير نتائج تجربة Khorana:

★ في حالة حصوله على ببتيدات من تتابع نوعين من الأحماض الأمينية بأن استعمال:

- السيرين (Ser) يحدده تتابع (UCC) والوسين بتتابع (CUC).

- الثريونين يحدده تتابع (ACA) والهستيدين بتتابع (CAC).

★ يفسر إنتاج ثنائيات وثلاثيات ببتيدي عند استعمال 4 رامزات من 3 أنواع من القواعد بوجود

رامزات لا يقابلها أي حمض أميني وهي رامزات التوقف (Stop).

وتتمثل في الرامزات التالية: UGA، UAA، UAG.

الجزء الثالث:

توضيح تحكم الرامزات في تحديد أنواع الأحماض الأمينية:

• يتشكل الـ ARNm من أربع أنواع من النيكليوتيدات تختلف بنوع القاعدة الأزوتية A, C, U, G

• يسمح الأربع أنواع من القواعد في الـ ARNm بتكوين 64 رامزة.

• كل رامزة من تتابع 3 من القواعد تشكل الرامزة وحدة الشفرة الوراثية

• تتحكم بعض الرامزات في استعمال حمض أميني واحد مثل رامزة الانطلاق AUG التي تشفر لاستعمال الميثيونين.

• يشفر لاستعمال بعض الأحماض الأمينية أكثر من رامزة

- من رامزتين مثل: AAU و AAC لأسبارجين (Asn).

- من 3 رامزات وهي: AUA و AUC و AUU للإزولوسين (Ile).

- من 4 رامزات مثل: GCU و GCC و GCA و GCG للألانين (Ala).

- من 6 رامزات مثل: CUU و CUC و CUA و CUG و UUA و UUG للوسين (Leu).

• بعض الرامزات ليس لها معنى هي: UAA و UAG و UGA رامزات التوقف.

الأستاذ: وصيفي ع الرحمان

