

الإختبار الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول (4 ن) :

الجزء الأول : أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير :

1/ لتكن الدالتان f و g المعرفتان على $]0; +\infty[$: $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = 2x + 1$ إذن

$$(f \circ g)'(4) = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

2/ لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ حيث : $h(x) = \frac{2x^2+4}{x-2}$ إذن(أ) الدالة h قابلة للإشتقاق على المجال $[2; +\infty[$ حيث : $h'(x) = \frac{x^3+8}{(x-2)^2}$ (ب) التقريب التالفي للدالة h بجوار 2 هو $h(x) \cong 2x + 1$ 3/ لتكن الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}$ حيث : $k(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$ (أ) المنحنى البياني للدالة k في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس متناظر بالنسبة إلى حامل محور الترتيب(ب) المنحنى البياني للدالة N المعرفة على $\mathbb{R}$: $N(x) = -k(x+3) + 2$ هو صورة (C_K) بانسحاب شعاعه $\vec{u}(-3; 2)$

التمرين الثاني (8 ن) :

يحتوي كيس غير شفاف على 6 كريات متماثلة , منها 3 كريات حمراء و كريتين سوداوين و كرة صفراء مرقمة بالرقم 2 نرسم للكريات بالرمز $(R_1, R_2, R_3, N_1, N_2, J_2)$, نسحب من الكيس كرتين على التوالي بدون ارجاع الكرة المسحوبة الأولى إلى الكيس , نعتبر الحوادث التالية :

A : "الكريتان المسحوبتان تحملان نفس اللون" B : "الكريتان المسحوبتان تحملان الرقم 2"

C : "الكريتان المسحوبتان جداء رقميهما عدد أولي" D : "الكريتان المسحوبتان مجموع رقميهما عدد فردي"

1/ عين مجموعة الإمكانات Ω 2/ احسب $p(A)$; $p(B)$; $p(C)$; $p(D)$; $p(A \cap C)$; ثم استنتج كلا من $p(\bar{A})$, $p(A \cup C)$

نعتبر اللعبة التالية : يربح اللاعب 30 دج كلما ظهرت كرة حمراء اللون و يخسر 20 دج كلما ظهرت كرة سوداء اللون و يخسر 5 دج كلما ظهرت كرة صفراء اللون , ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل إمكانية قيمة الربح أو الخسارة المناسبة لها

3/ عين قيم المتغير العشوائي X و عرف قانون احتمال للمتغير X

4/ هل اللعبة في صالح اللاعب ؟ علل

5/ احسب التباين $V(X)$ للمتغير العشوائي X

التمرين الثالث (08 ن) :

- ① لتكن الدالة المعرفة على المجال $[-2; 2]$ بالعلاقة: $f(x) = x^3 - 3x + 2$
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(0; \vec{i}; \vec{j})$
- 1/ عين f' الدالة المشتقة للدالة f و ادرس اشارتها على المجال $[-2; 2]$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f
- 2/ شكل جدول تغيرات الدالة f
- 3/ عين حصرا للدالة f على المجال $[-2; 2]$
- 4/ اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$
- 5/ بين ان (C_f) يقبل مماسين معامل توجيه كل منهما 9 (لا يطلب تعيين معادلتيهما)
- 6/ بين ان النقطة $\omega(0; 2)$ مركز تناظر ل (C_f)
- 7/ عين نقطة التقاطع بين (C_f) و حامل محور الترتيب ثم أنشئ (C_f) على المجال $[-2; 2]$
- 8/ أنشئ المسقيم (Δ) ذو $y = x + 2$: (Δ) ثم استنتج حلول المتراجحة $f(x) > x + 2$
- ② لتكن الدالة المعرفة على المجال $[-2; 2]$ بالعلاقة: $g(x) = |x^3| - 3|x| + 2$
- أ) بين أن g دالة زوجية
- ب) اكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة
- ت) استنتج كيفية انشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم أنشئه في نفس المعلم السابق

بالتوفيق